


Ampicillin Dosierer

Ampicillin-Dosierer 50 mg/ml Salbe zum Eingeben Für Hunde und Katzen



- **Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile**

1 g Salbe enthält:

Wirkstoff(e):

Ampicillin-Trihydrat 57,8 mg
(entsprechend: 50,0 mg Ampicillin)

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckmäßige Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

Keine

- **Anwendungsgebiete**

Für Hunde und Katzen zur Therapie von folgenden durch grampositive und/oder gramnegative ampicillinempfindliche Keime hervorgerufene Krankheiten:

- Infektionen des Atmungstraktes
- Infektionen des Rachenraumes
- Infektionen des Darmtraktes
- Infektionen der Harnorgane
- Sekundärinfektionen bei Virus-erkrankungen

- **Gegenanzeigen**

Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren.

Schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie.

Vorliegen von β -Lactamase-bildenden Erregern.

Nicht gleichzeitig mit bakteriostatisch wirkenden Antibiotika verabreichen.

Orale Anwendung bei ruminierenden Tieren und Pferden.

Anwendung bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern und anderen Kleinnagern.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

- **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Zum Eingeben.

Hund und Katze

Je nach Schwere der Erkrankung 10-40 mg Ampicillin pro kg Körpergewicht (KGW), oral, 3 mal täglich eingeben (entsprechend 1 - 4 g Ampicillin Dosierer pro 5 kg KGW, oral 3 mal täglich) (1 Teilstrich auf dem Dosiererstempel entspricht 1 g Salbe).

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 3 – 5 Tage, sollte aber mindestens 2 Tage über das Abklingen der Krankheitssymptome hinaus fortgesetzt werden.

Sollte nach maximal 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und ggf. eine Therapieumstellung durchzuführen.

- **Hinweise für die richtige Anwendung**

Ampicillin muss mindestens eine Stunde vor der Fütterung verabreicht werden.

Beim Vorliegen akuter Krankheitszustände sollte die Therapie mit einem parenteral zu verabreichenden Präparat eingeleitet werden.

Falls die vollständige Aufnahme des Arzneimittels nicht gewährleistet ist, ist ein Therapiewechsel erforderlich.

- **Handelsform**

10 g

Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.

AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

