

# Clenovet 0,025 mg/ml Gel

## Gel zum Eingeben Für Pferde

- **Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile**

1 ml Gel enthält:

Wirkstoff(e):

Clenbuterolhydrochlorid ..... 0,025 mg

Sonstige Bestandteile:

Methyl-4-hydroxybenzoat ..... 2,02 mg

Propyl-4-hydroxybenzoat ..... 0,26 mg

- **Anwendungsgebiet(e)**

Atemwegserkrankungen, die mit Bronchospasmen einhergehen, wie subakute und chronische Bronchitis und Bronchiolitis, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD), unterstützend bei akuter Bronchitis und Bronchopneumonie.

*Hinweis:*

Clenovet 0,025 mg /ml Gel darf nur bei Equiden zur Behandlung von Atemwegserkrankungen angewendet werden. Bei Equiden, die zur Schlachtung vorgesehen sind, ist ein Abgabebeleg gemäß § 13 Abs. 1 der Verordnung über tierärztliche Hausapotheken (TÄHAV) auszustellen.

- **Gegenanzeigen**

- Hyperthyreose
- Tachykardie Herzrhythmusstörungen
- Tragende Stuten, 1 bis 2 Tage vor dem errechneten Geburtstermin bzw. bei Anzeichen der nahenden Geburt
- Säugende Stuten in den ersten Lebenswochen des Fohlens
- Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist
- Nicht bei Equiden anwenden, die zu Mastzwecken gehalten werden

- Eine Umwidmung des Arzneimittels gemäß § 56a Abs. 2 AMG für andere lebensmittelliefernde Tiere ist ausgeschlossen, ausgenommen hiervon sind andere Equiden, sofern sie nicht zur Mast bestimmt sind

- **Nebenwirkungen**

- Tremor
- Tachykardie
- Schweißausbruch
- Unruhe
- Müdigkeit
- Urtikaria
- Verstärkte Blutungsgefahr bei Operationen

- **Dosierung für jede Tierart,  
Art und Dauer der Anwendung**

Gel zum Eingeben über das Futter.

0,8 µg Clenbuterolhydrochlorid pro kg Körpermasse (KM) entsprechend 4 ml Clenovet 0,025 mg/ml Gel pro 125 kg KM oder 16 ml Clenovet 0,025 mg/ml Gel pro 500 kg KM zweimal täglich im Abstand von 12 Stunden. Ein Hub aus der Dosierpumpe ergibt 4 ml Gel.

*Behandlungsdauer:*

Bei akuten und subakuten Erkrankungen 10 bis 14 Tage, in chronischen Fällen auch länger. Bei deutlicher Besserung der Symptomatik kann die Dosis nach etwa 10 Tagen auf die Hälfte reduziert werden.

Vor der Anwendung wird der Verschluss der Flasche entfernt, um anschließend die Dosierpumpe auf das Flaschengewinde aufzudrehen. Durch das Drücken der Dosierpumpe werden bei einem Hub 4 ml Gel entleert.



### AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de



Nach der Anwendung wird die Dosierpumpe wieder abgeschraubt und die Flasche durch Aufdrehen des Verschlusses geschlossen.

- **Wartezeit**

*Pferde:*

Essbare Gewebe ..... 28 Tage

Nicht anwenden bei Stuten, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

- **Wechselwirkungen**

Wirkungsverstärkung einschließlich vermehrter Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Anwendung mit Glukokortikoiden,  $\beta_2$ -Sympathomimetika, Anticholinergika und Methylxanthinen.

Bei gleichzeitiger Gabe von halogenhaltigen Narkotika (Isofluran, Methoxyfluran) erhöhte Gefahr ventrikulärer Arrhythmien. Erhöhte Arrhythmiegefahr bei gleichzeitiger Gabe von Digitalisglykosiden. Abschwächung der Wirkung von Wehenmitteln (Oxytocin, Prostaglandin F<sub>2a</sub>).

- **Handelsform**

355 ml Gel und Dosierpumpe

*Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts.*

**AUFTRAGSANNAHME**

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

