

# Dexamethason in DMSO

**0,05 mg/ml (Dexamethason) + 990 mg/ml (Dimethylsulfoxid)**

**Lösung zum Auftragen auf die Haut.**

**Für Pferde, Rinder, Schweine, Hunde, Katzen**

- **Wirkstoff(e) und sonstige**

- **Bestandteile**

1 ml Lösung enthält:

*Wirkstoff(e):*

Dexamethason                      0,05 mg  
Dimethylsulfoxid                      990,0 mg

*Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckmäßige Verabreichung des Mittels erforderlich ist:*

Keine

- **Anwendungsgebiet(e)**

Dexamethason in DMSO wirkt palliativ bei folgenden Erkrankungen:

Nicht infektiöse akute und subakute entzündliche Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Bursitis, Arthritis, Periarthritis, Myositis, traumatischen Schwellungen. Nicht infektiöse entzündliche Erkrankungen der Haut, Juckreiz bei nicht infektiösen Hauterkrankungen. Bei Anwendung von Glukokortikoiden ist die Indikation immer sorgfältig zu prüfen.

- **Gegenanzeigen**

Nicht anzuwenden als orale, parenterale und intramammäre Anwendung. Die Anwendung in der Trächtigkeit sollte nur unter strenger Indikationsstellung erfolgen und in der frühen Phase der Trächtigkeit möglichst vermieden werden. Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

- **Nebenwirkungen**

Lokal kann es zu Hautirritationen, Wärme, Erythem, Ödem, Brennen und Dehydratation der Haut kommen. Durch ein Stoffwechselprodukt von DMSO kann vorübergehend ein knoblauchartiger Geruch der Ausatemluft und des Harns entstehen.

- **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Zum Auftragen auf die Haut.

Mit den beigegeführten Handschuhen auf die betroffene Stelle auftragen und einziehen lassen.

*Pferde, Rinder, Schweine:*

5 – 15 ml Dexamethason in DMSO 2 x täglich auf die erkrankte Stelle auftragen.

*Hunde, Katzen:*

0,5 – 2,5 ml Dexamethason in DMSO 2 x täglich auf die erkrankte Stelle auftragen.

Die Behandlungsdauer beträgt 3 Tage. Bei dichtem Fell sollten vor der Anwendung die Haare geschoren werden.

- **Wartezeit**

*Essbare Gewebe:*



Pferd, Rind: ..... 4 Tage

Schwein: ..... 3 Tage

*Milch:*

Rind: ..... 2 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.



## AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de



- **Besondere Warnhinweise**

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Die Anwendung sollte nur auf trockener, sauberer Haut erfolgen. Desamethason in DMSO sollte nicht unter Bandagen angewendet werden. Aufgrund der penetrationsfördernden Wirkung von DMSO sollten keine weiteren Präparate gleichzeitig aufgetragen werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Bei der Applikation von Dexamethason in DMSO sind Handschuhe zu tragen. Der Haut- und Schleimhautkontakt des Anwenders mit Dexamethason in DMSO ist zu vermeiden. Schwangere Frauen sollten nicht mit Dexamethason in DMSO in Kontakt kommen.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Die Anwendung von Dexamethason in der Trächtigkeit sollte nur unter strenger Indikationsstellung erfolgen und in der frühen Phase der Trächtigkeit möglichst vermieden werden. Glukokortikoide und DMSO gehen in die Milch über.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Dexamethason in DMSO soll nicht gleichzeitig mit Cholinesterasehemmern angewendet werden. Die Resorption anderer topisch angewendeter Wirkstoffe wird durch Dexamethason in DMSO stark erhöht.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel), falls erforderlich

Bei Überdosierungen kann es zu Krämpfen und Lungenödem kommen. Die Therapie erfolgt symptomatisch.

Inkompatibilitäten

Vermischungen mit anderen Arzneimitteln sind wegen der Gefahr möglicher Inkompatibilitäten zu vermeiden.

- **Handelsform**

100 ml

Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.

**AUFTRAGSANNAHME**

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

