

# Equi-Wurmpaste 425,37 mg/g

## Pyranтелеmbonat Für Pferde



- **Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile**

1 Injektor mit 31,27 g Paste enthält:

*Wirkstoff*

Pyranтелеmbonat ..... 13,30 g

*Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist*

Natriummethyl-4-hydroxybenzoat .... 0,078 g

Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat ..... 0,047 g

Equi-Wurmpaste ist eine gelbe Paste.

- **Anwendungsgebiete**

Zur Behandlung des Befalls mit darmständigen adulten Stadien von großen Strongyliden (*Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*), kleinen Strongyliden (*Triodontophorus* spp., *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp., *Cylicostephanus* spp.), Pfriemenschwänzen (*Oxyuris equi*), Spülwürmern (*Parascaris equorum*) und Bandwürmern (*Anoplocephala perfoliata*) bei Pferden ab einem Alter von 8 Wochen. Gegen *Anoplocephala perfoliata* ist Pyrantelembonat nur teilweise wirksam. Eine mögliche Pyrantel-Resistenz kleiner Strongyliden ist bekannt.

- **Gegenanzeigen**

Nicht bei stark geschwächten Tieren anwenden. Nicht anwenden bei Fohlen unter 8 Wochen. Nicht anwenden bei Tieren mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Pyrantel oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei trächtigen Stuten zur Behandlung des Befalls mit Bandwürmern. Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

- **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

*Pferd*

Zum Eingeben.

Das Tierarzneimittel ist ausschließlich für Pferde zur einmaligen oralen Anwendung vorgesehen. Um die Verabreichung einer korrekten Dosierung zu gewährleisten, sollte das Körpergewicht so genau wie möglich ermittelt und die Genauigkeit der Dosiervorrichtung geprüft werden.

Soweit Tiere gemeinsam und nicht individuell behandelt werden, sollten sie entsprechend ihrem Körpergewicht in Gruppen eingeteilt und dosiert werden, um Unter- oder Überdosierung zu vermeiden.

Einmalig 19 mg Pyranтелеmbonat pro kg Körpergewicht, entsprechend 1 Injektor Equi-Wurmpaste für ein Pferd mit 700 kg Körpergewicht.

Zur Behandlung des Bandwurmbefalls mit *Anoplocephala perfoliata* einmalig 38 mg Pyranтелеmbonat pro kg Körpergewicht, entsprechend 2 Injektoren für ein Pferd mit 700 kg Körpergewicht.

- **Wartezeit**

*Pferd*

Essbare Gewebe: ..... 0 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

- **Handelsform**

40 Injektoren mit je 31,27 g Paste

*Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.*

### AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

