

# Novacen® 500 mg/ml Injektionslösung

## Metamizol-Natrium 1 H<sub>2</sub>O

### Für Pferde, Rinder, Schweine und Hunde

- **Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile**

1 ml Injektionslösung enthält:

*Wirkstoff*

Metamizol-Natrium 1 H<sub>2</sub>O ..... 500,0 mg

*Sonstige Bestandteile*

Benzylalkohol ..... 30,0 mg

- **Anwendungsgebiet(e)**

*Pferde, Rinder und Schweine*

Krankheitszustände, bei denen eine positive Beeinflussung durch die analgetische, antipyretische, antiphlogistische und/oder spasmolytische Wirkung von Metamizol zu erwarten ist. Dazu gehören im Besonderen: Schmerzbehandlung bei Kolikformen unterschiedlicher Genese oder sonstigen spastischen Zuständen der Bauchhöhlenregion bei Pferd und Rind, Lumbago, Schlundverstopfung, fieberhafte Erkrankungen wie schwere Mastitiden, MMA (Mastitis-Metritis-Agalaktie) – Komplex, Schweineinfluenza, akute und chronische Arthritiden, rheumatische Zustände der Muskulatur und der Gelenke, Neuritiden, Neuralgien, Tendovaginitiden.

*Hunde*

Krankheitszustände, bei denen eine positive Beeinflussung durch die analgetische, antipyretische, antiphlogistische und/oder spasmolytische Wirkung von Metamizol zu erwarten ist. Dazu gehören im Besonderen: Akute und chronische Arthritiden, rheumatische Zustände der Muskulatur und der Gelenke, Neuritiden, Neuralgien und Tendovaginitiden.

- **Gegenanzeigen**

Bei folgenden Zuständen soll Novacen nicht angewendet werden:

- Vorliegen von Magen-Darm-Ulzera
- chronischen gastrointestinalen Störungen

**AUFTRAGSANNAHME**



PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

- Störungen des hämatopoetischen Systems
- Niereninsuffizienz
- Koagulopathien
- Bronchialasthma

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.



- **Dosierung für jede Tierart,**

**Art und Dauer der Anwendung**

Zur intravenösen oder intramuskulären Anwendung.

*Pferde*

Zur langsamen intravenösen Anwendung. 20 – 50 mg Metamizol-Natrium / kg Körpergewicht (KGW), entspricht 2 – 5 ml Novacen pro 50 kg KGW.

*Rinder*

Zur langsamen intravenösen Anwendung. 20 – 40 mg Metamizol-Natrium / kg KGW, entspricht 2 – 4 ml Novacen pro 50 kg KGW.

*Schweine*

Zur intramuskulären und langsamen intravenösen Anwendung. 15 – 50 mg Metamizol-Natrium / kg KGW, entspricht 0,3 – 1 ml Novacen pro 10 kg KGW.

*Hunde*

Zur intramuskulären und langsamen intravenösen Anwendung. 20 – 50 mg Metamizol-Natrium / kg KGW, entspricht 0,04 – 0,1 ml Novacen pro kg KGW.

Die angegebenen Dosen sind Einzeldosen und können bei Bedarf im Abstand von 8 Stunden wiederholt werden.



040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

- **Wartezeit**

*Essbare Gewebe*

Pferde und Rinder (i.v.) ..... 12 Tage

Schweine (i.v.,i.m.) ..... 15 Tage

*Milch*

Rinder (i.v.) ..... 4 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

- **Handelsform**

100 ml

*Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.*

**AUFTRAGSANNAHME**

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

