

Oxacillin-Na 1000 mg – Euter-Injektor

Suspension zur intramammären Anwendung Für Rinder (laktierende Milchkühe)



- **Wirkstoff(e) und sonstige**

- **Bestandteile**

- 1 Euter-Injektor mit 10 g Suspension enthält:

- Arzneilich wirksame Bestandteil(e):*

- Oxacillin-Natrium-Monohydrat 1042,5 mg (entsprechend 1000 mg Oxacillin-Natrium wasserfrei bzw. 948 mg Oxacillin)

- Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:*

- Weißes Vaseline

- Mittelkettige Triglyceride

- **Anwendungsgebiet(e)**

- Zur Therapie von Euterentzündungen in der Laktationsperiode, die durch Oxacillinempfindliche Streptokokken und Staphylokokken (inkl. β -Lactamase-bildende Stämme) hervorgerufen sind.

- Die Anwendung von Oxacillin-Na 1000 Euter-Injektor sollte unter Berücksichtigung eines Antibiogramms erfolgen.

- **Gegenanzeigen**

- Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tiere

- Resistenzen gegen Isoxazolylpenicilline und Cephalosporine

- **Nebenwirkungen**

- Allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Anaphylaxie).

- Beim Auftreten einer allergischen Reaktion ist das Arzneimittel sofort abzusetzen und symptomatisch zu behandeln:

- Bei Anaphylaxie: Adrenalin (Epinephrin) und Glukokortikoide i.v.

- Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistaminika und/oder Glukokortikoide.

- **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

- Zur intramammären Anwendung.

- 1000 mg Oxacillin-Natrium: pro Euterviertel, entsprechend 10 g Oxacillin-Na 1000 mg-Euter-Injektor (Gesamtinhalt eines Euterinjektors) pro Euterviertel. Dreimalige Behandlung im Abstand von 24 Stunden.

- **Hinweise für die richtige Anwendung**

- Unmittelbar vor jeder Behandlung sind alle Euterviertel sorgfältig auszumelken. Nach Reinigung und Desinfektion der Zitzenkuppe wird der gesamte Inhalt eines Euterinjektors Oxacillin-Na 1000 Euter-Injektor pro erkranktes Euterviertel eingebracht.

- Sollte nach 2 Behandlungstagen keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und ggf. eine Therapieumstellung durchzuführen.

- **Wartezeit**

- Rind:

- Essbare Gewebe: 6 Tage

- Milch: 6 Tage

- **Handelsform**

- Packung mit 20 Euterinjektoren mit je 10 g Suspension

- Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.*

AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

