

# Prazinex 56,8 mg/ml

## Injektionslösung. Praziquantel Für Hunde und Katzen

### o Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

1 ml Injektionslösung enthält:

*Wirkstoff(e):*

Praziquantel ..... 56,80 mg

*Sonstige Bestandteile:*

Chlorobutanol-Hemihydrat ..... 5,00 mg

Benzylalkohol ..... 75,00 mg

### o Anwendungsgebiet(e)

Anwendungsgebiete sind alle Altersstadien aller bei Hund und Katze vorkommenden Bandwurm-Spezies:

*Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Taenia taeniaeformis (T. hydatigena), Multiceps multiceps, Joyeuxiella pasqualei, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis.*

### o Gegenanzeigen

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

### o Nebenwirkungen

Die bei schweren Hunden anzuwendenden Injektionsvolumina können bei subkutaner Applikation zu lokalen Reizerscheinungen führen. Bei besonders empfindlichen Tieren kann es zu leichten Schmerzreaktionen und/oder Erbrechen, Schläfrigkeit sowie bei Katzen auch zu Diarrhö, Salivation und Ataxie kommen.

### o Dosierung für jede Tierart,

#### Art und Dauer der Anwendung

Zur intramuskulären oder subkutanen Injektion.

Zur Echinokokkenbekämpfung ist die intramuskuläre Verabreichung vorzuziehen.

Die Dosierung beträgt für Hund und Katze 1 x 0,1 ml/kg Körpergewicht, das entspricht 5,7 mg Praziquantel/kg Körpergewicht.

Joyeuxiella pasqualei - Infektion:

20,0 – 25,0 mg/kg KGW.

Injektionsvolumina über 3 ml sollen bei subkutaner Injektion auf zwei Stellen verteilt werden.

Die Anwendung erfolgt einmalig.

### o Hinweise für die richtige Anwendung

Siehe oben (Art der Anwendung).

### o Wartezeit

Entfällt.

*Hinweis:* Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.


### o Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 30°C lagern. Vor Licht schützen. Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 4 Wochen

### o Besondere Warnhinweise

*Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender*

Bei Echinococcose besteht Ansteckungsgefahr für den Menschen. Bei nachgewiesenem Echinococcus-Befall ist nach der Therapie eine Kontrolluntersuchung und gegebenenfalls eine Wiederholungsbehandlung erforderlich.



### AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de



### *Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren*

Nach häufiger wiederholter Anwendung von Wirkstoffen einer Substanzklasse von Anthelminthika kann sich eine Resistenz gegenüber der gesamten Substanzklasse entwickeln.

### *Trächtigkeit und Laktation*

Keine Angaben.

### *Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen*

Eine gleichzeitige Gabe von Dexamethason kann zur Herabsetzung der Serum-Konzentration von Praziquantel führen.

### *Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel)*

Dosierungen bis zur 10-fachen (50 mg/kg KGW) werden im Allgemeinen symptomlos vertragen. Höhere Dosierungen (50 – 100 mg/kg KGW) können bei der Katze zu Ataxie und Depression führen.

### *Inkompatibilitäten*

Da keine Inkompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Tierarzneimittel nicht mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden.

### **o Handelsform**

5 x 10 ml

Verschreibungspflichtig!

*Die aktuellen und vollständigen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.*

### **AUFTRAGSANNAHME**

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

