

# Prazinex

## Injektionslösung. Praziquantel Für Hunde und Katzen

- **Wirkstoffe und sonstige Bestandteile**

1 ml Injektionslösung enthält:

*Wirkstoffe:*

Praziquantel ..... 56,80 mg

Sonstige Bestandteile:

Chlorobutanol-Hemihydrat ..... 5,00 mg

Benzylalkohol ..... 75,00 mg

- **Anwendungsgebiete**

Anwendungsgebiete sind alle Altersstadien aller bei Hund und Katze vorkommenden Bandwurm-Spezies: Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Taenia teaniaeformis (T. hydatigera), Multiceps multiceps, Joyeuxiella pasqualei, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis.

- **Gegenanzeigen**

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

- **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Eine gleichzeitige Gabe von Dexamethason kann zur Herabsetzung der Serum-Konzentration von Praziquantel führen.

- **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Zur intramuskulären oder subkutanen Injektion. Zur Echinokokkenbekämpfung ist die intramuskuläre Verabreichung vorzuziehen. Die Dosierung beträgt für Hund und Katze 1 x 0,1 ml/kg Körpergewicht, das entspricht 5,7 mg Praziquantel/kg Körpergewicht. Joyeuxiella pasqualei - Infektion: 20,0 – 25,0 mg/kg KGW.

Injektionsvolumina über 3 ml sollen bei subkutaner Injektion auf zwei Stellen verteilt werden. Die Anwendung erfolgt einmalig.

- **Nebenwirkungen**

Die bei schweren Hunden anzuwendenden Injektionsvolumina können bei subkutaner Applikation zu lokalen Reizerscheinungen führen. Bei besonders empfindlichen Tieren kann es zu leichten Schmerzreaktionen und/oder Erbrechen, Schläfrigkeit sowie bei Katzen auch zu Diarrhö, Salivation und Ataxie kommen.

- **Wartezeit**

Entfällt.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

- **Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel), falls erforderlich**


Dosierungen bis zur 10-fachen (50 mg/kg KGW) werden im Allgemeinen symptomlos vertragen. Höhere Dosierungen (50 – 100 mg/kg KGW) können bei der Katze zu Ataxie und Depression führen.

- **Inkompatibilitäten**

Da keine Inkompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Tierarzneimittel nicht mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden.

- **Handelsform**

5 x 10 ml



### AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

