

Tetracyclin-HCl Uterus-Stab 2000 mg

Tablette zur intrauterinen Anwendung Für Rinder



- **Arzneilich wirksame(r) Bestandteil(e) und sonstige Bestandteile**

1 Tablette enthält

Wirkstoff:

Tetracyclinhydrochlorid 2000 mg
(entsprechend 1848,2 mg Tetracyclin)

Gelbe Tablette mit zentraler Kerbe.

- **Anwendungsgebiet(e)**

Zur Therapie und Prophylaxe im Puerperium bei Kühen: bei Retentio secundinarum sowie bei Endometritiden, die durch Tetracyclinempfindliche Erreger verursacht werden sowie nach schweren geburtshilflichen Eingriffen (Fetotomie, Sectio caesarea).

- **Gegenanzeigen**

Nicht anwenden bei Infektionen mit Tetracyclin-resistenten Erregern. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Tetracyclinen. Nicht anwenden bei schweren Nieren- oder Leberfunktionsstörungen.

- **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Zur intrauterinen Anwendung.

Kühe:

2 g Tetracyclinhydrochlorid / Tier / Tag
entsprechend 1 Tetracyclin-HCl Uterus-Stab/Tier/Tag

1-3 mal im Abstand von 1 bis 2 Tagen

- **Wartezeit**

Rind:

Essbare Gewebe: 10 Tage

Milch: 4 Tage

- **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren**

Die Anwendung von Tetracyclin-HCl Uterus-Stab sollte unter Berücksichtigung eines Antibiotogramms erfolgen. Tetracyclin besitzt eine enge therapeutische Breite; es ist daher auf eine genaue Dosierung zu achten.

- **Handelsform**

100 Tabletten

Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.

AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

