

Xylarium®

20 mg Xylazin

Injektionslösung

Für Pferde, Rinder, Hunde und Katzen

- **Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile**

Wirkstoff:

Xylazinhydrochlorid 23,3 mg/ml
(entspricht 20,0 mg Xylazin)

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

Methyl 4-hydroxybenzoat 1,0 mg/ml
Propyl 4-hydroxybenzoat 0,1 mg/ml

- **Anwendungsgebiete**

Hunde und Katzen:

Zur Sedierung. In Kombination mit anderen Substanzen zur Analgesie, Anästhesie und Muskelrelaxation.

Pferde:

Zur Sedierung und Muskelrelaxation. In Kombination mit anderen Substanzen zur Analgesie und Anästhesie.



Rinder:

Zur Sedierung, Muskelrelaxation und Analgesie bei kleinen Eingriffen. In Kombination mit anderen Substanzen zur Anästhesie.

- **Gegenanzeigen**

- Diabetes mellitus
- Erkrankungen, die mit Erbrechen einhergehen
- Verdacht auf Schlundverstopfung
- Magendrehung
- Lungen- und Herzerkrankungen, insbesondere ventrikuläre Arrhythmien
- Eingeschränkte Leber- und Nierenfunktion

- Anwendung in Verbindung mit sympathomimetischen Arzneimitteln wie Epinephrin
- Krampfneigung
- Hypotension, Schock



Xylazin soll im letzten Drittel der Trächtigkeit nicht zur Anwendung kommen.

- **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Art der Anwendung:

Zur intravenösen (i.v.), intramuskulären (i.m.) und subkutanen (s.c.) Anwendung.

Einmalige Anwendung.

Dosierung:

Rind:

0,016-0,1 mg/kg KGW i.v.
oder 0,08-0,5 ml/100 kg KGW
0,050-0,3 mg/kg KGW i.m.
oder 0,25-1,5 ml/100 kg KGW

Pferd:

0,6-1,0 mg/kg KGW i.v.
oder 3,0-6,0 ml/100 kg KGW

Hund:

1,0-3,0 mg/kg KGW i.m./i.v.
oder 0,5-1,5 ml/10 kg KGW

Katze:

2,0-4,0 mg/kg KGW i.m./s.c.
oder 0,1-0,2 ml/kg KGW

Zur Verlängerung der Wirkung oder bei Nachlassen derselben kann nach dem Ermessen des behandelnden Tierarztes und in Abhängigkeit vom körperlichen Zustand des Tieres mit 1/3 der Erstdosis nachdosiert werden.

AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:


PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de



Hinweise für die richtige Anwendung

Vor einer Xylazin-Behandlung ist das Körpergewicht des zu behandelnden Tieres präzise festzustellen. Die intravenöse Injektion ist -insbesondere bei Pferden- langsam zu verabreichen. Auf eine ausreichende Flüssigkeits-substitution ist zu achten.

- **Wartezeit**

Pferd, Rind:

Essbare Gewebe 1 Tag

Milch 1 Tag

- **Handelsform**

25 ml und 50 ml

Die aktuellen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Etiketts/der Gebrauchsinformation.

AUFTRAGSANNAHME

PER TELEFON:

PER FAX:

PER MAIL:

040 / 736 797 – 47

040 / 736 797 – 60

info@pharma-partner-gmbh.de

